

HEALTH AND SAFETY GUIDELINES

In accordance with Board Policy 5142, the following guidelines have been established to provide a safe school environment that is conducive to learning and ensure student safety and the prevention of student injury.

Please refer to the following guidelines to determine if your child's needs would be best met by coming to school or staying at home. All students benefit from a healthy classroom environment and are most successful when rested and feeling good. Thank you for your assistance.

Send to School

- Fever free for 24 hours without fever medication
- No vomiting in the last 24 hours
- No diarrhea in the last 24 hours
- Minor cold symptoms
- Asthma responsive to medication
- With a doctor's clearance following hospitalization, orthopedic injury or communicable disease

Orthopedic Protocol - All ace wraps, braces, splints, casts, and crutches must have a note from the medical provider or the school site certified athletic trainer. Students with casts and crutches will not be allowed to actively participate in playground/PE activities because of the potential danger to the student and others. High school athletes will follow the direction of certified athletic trainer for physical activities.

Keep at Home

- Fever in the last 24 hours
- Vomiting in the last 24 hours
- Diarrhea in the last 24 hours
- Signs of illness that interfere with learning, sleep, activity or play
- Cold symptoms such as frequent coughing and or nasal discharge that do not respond to medication.

See Health Practitioner and Keep Home

- Complaints of ear pain or drainage from ears
- Nasal discharge which persists over 14 days duration
- Persistent sore throat with fever or rash
- Undiagnosed skin rash or sores with redness, swelling, or fluid
- Redness of the eye with discharge or swelling
- Asthma not responding to medication, peak flow 50% or less, or treatment required more than every 4 hours.

GUÍAS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

Conforme a la Norma 5142 de la Mesa Directiva de Educación, las siguientes guías han sido establecidas para proveer un ambiente escolar seguro que favorezca el aprendizaje, la seguridad y la prevención de las lesiones corporales de los estudiantes.

Por favor consulten las siguientes guías para determinar si sería mejor mandar a hijo a la escuela o mantenerlo en casa para satisfacer sus necesidades. Todos los estudiantes se benefician de un ambiente saludable en el salón de clases y tienen más éxito cuando se encuentran descansados y se sienten bien. Gracias por su ayuda.

Mande a su hijo(a) a la escuela cuando:

- No haya tenido fiebre por 24 horas sin medicamento para la fiebre
- No haya vomitado en las últimas 24 horas
- No haya tenido diarrea en las últimas 24 horas
- Síntomas de resfriado leves
- Asma está respondiendo al medicamento
- Tiene la autorización del médico de regresar a la escuela después de estar hospitalizado, una lesión ortopédica o una enfermedad contagiosa

Protocolo ortopédico - Todos los vendajes Ace, aparatos ortopédicos, tablillas, enyesado y muletas deben tener una nota de su médico o del entrenador atlético titulado de la escuela. Los estudiantes enyesados o con muletas no tendrán permitido participar en las actividades en el patio de recreo o en la clase de Educación Física debido que podría ser peligroso para el estudiante y otras personas. Los estudiantes de preparatoria seguirán las instrucciones del entrenador atlético titulado con respecto a las actividades físicas.

Mantenga a su hijo(a) en casa cuando:

- Fiebre durante las últimas 24 horas
- Vómito en las últimas 24 horas
- Diarrea en las últimas 24 horas
- Señales de enfermedad que interfieran con el aprendizaje, sueño, actividades y juego
- Síntomas de resfriado: tos frecuente y/o secreción nasal que no mejoran con los medicamentos

Visite a su médico y mantenga a su hijo(a) en casa cuando:

- Se queje de dolor de oído o secreción del oído
- Secreción nasal amarillosa o verdosa que persiste por más de 14 días
- Dolor de garganta persistente con fiebre o erupción
- Erupción en la piel que no haya sido diagnosticada o llagas con enrojecimiento, inflamación o fluido corporal.
- Irritación de los ojos con secreción o inflamación
- Asma que no está respondiendo al medicamento, con flujo del 50% o menos, o que requiera de tratamiento con una frecuencia de más de cada 4 horas